

105 mm

Bilastine oral solution

Bilastine 2.5 mg/mL oral solution is packaged in an amber glass bottle with a 4 mL cup and a leaflet.

Precautions and warnings:

- » If there is allergic history (such as anaphylactic reactions) to Bilastine or other antihistamines, stop taking Bilastine.
- » Talk to doctor or pharmacist before using this solution if the patient has moderate or severe renal impairment or is taking other medicines.
- » Precaution is necessary of how this medicine effects on patients before driving or operating machinery.
- » Always use this medicine exactly as doctor or pharmacist has told.
- » Bilastine should not be used in patients with a history of QTc prolongation like patients with history of cardiac arrhythmias; hypokalemia; hypomagnesaemia; significant bradycardia; family history of sudden cardiac death; concomitant use of other QT/QTc-prolonging drugs.
- » Do not give Bilastine to children under 6 years old with a body weight below 20 kg.
- » Do not use this medicine if you notice any visible signs of particles.

Pregnancy and breast-feeding:

If you are pregnant or breast-feeding, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Dosage and administration:

- » Take the solution one hour before or two hours after taking food or fruit juice.
- » If you forget to take the daily dose on time, give it on the same day as soon as you remember. Then, give the next dose on the next day at the usual time as prescribed by the doctor. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.
- » If you are suffering from kidney or liver disorders, consult the doctor.
- » The oral solution is accompanied by a cup for dosage with a mark of 4 mL (10 mg Bilastine per dosing), which will help you to dose the oral solution correctly.
- » Administer directly from the cup.

Dosage of each drug is determined by doctor, but the usual dosage of Bilastine is as follows:

Allergic disorders (rhinoconjunctivitis and urticaria):

- » Children 6 to 11 years old with a body weight of at least 20 kg: 4 mL (10 mg Bilastine) once a day
- » Adults and adolescents (12 years and over 12 years of age): 8 mL (20 mg Bilastine) once a day

Adverse reactions:

- » Like all medicines, this medicine may cause unwanted side effects. In case of the following side effects, consult with the pharmacist or doctor.
- » Those need for medical attention: Stop treatment and contact doctor if you have allergic reactions like difficulty in breathing, dizziness, collapsing or losing consciousness, swelling of your face, lips, tongue or throat, and/or swelling and redness of the skin.
- » Common: Headache; drowsiness
- » Uncommon: Abnormal ECG heart tracing, irregular heartbeat; changes in liver or kidney function; dizziness, anxiety, tiredness, feeling of weakness, difficulty in sleeping; stomach pain, increased appetite, increased weight, nausea, indigestion, diarrhea, gastritis, thirst, dyspnea; dry or uncomfortable nose, dry mouth; itching; oral herpes; fever; tinnitus; increased blood fat

Drug interactions:

- » Inform your physician if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

Medicines which may interact with Bilastine:

- » Cyclosporine; Erythromycin; Ketoconazole; Ritonavir; Rifampicin; Diltiazem; Lorazepam

Storage:

Store the oral solution below 30°C, protect from moisture, light, freezing and children.
The shelf life after first opening is 6 months.

Manufactured by
Pursina Pharmaceutical Co.
Tehran-Iran



142 mm

محلول خوراکی بیلاستین

محلول خوراکی

بیلاستین حاوی ۲/۵ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر ماده موثره بیلاستین می‌باشد که در بطری شیشه‌ای ۱۲۰ میلی‌لیتری قهوه‌ای رنگ با درب آلومینیومی به همراه پیچانه‌ی ۴ مدرج ۴ میلی‌لیتری و برگه راهنما در یک جعبه مقوایی بسته بندی می‌شود.

دسته دارویی: آنتی هیستامین (گیرنده H₁)

هشدارها و احتیاطات:

- « در صورت سابقه حساسیت به بیلاستین یا سایر آنتی هیستامین‌ها (مانند واکنش‌های آنافیلاکتیک) باید مصرف بیلاستین قطع و به پزشک یا داروساز اطلاع داده شود.
- « در صورت نارسایی کلیوی متوسط تا شدید یا مصرف سایر داروها، پیش از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- « در صورت مصرف این دارو از رانندگی و یا کار با ماشین آلتی که نیاز به هشیاری کامل دارند، اجتناب نمایید.
- « دارو باید دقیقاً طبق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- « محلول خوراکی بیلاستین نباید در بیماران با سابقه QT prolongation مانند افراد با سابقه آریتمی قلبی، هایپوکالمی، هایپومگنیزمی؛ پرادی کاردی شدید؛ سابقه خانوادگی ایست ناگهانی قلبی؛ مصرف همزمان سایر داروهای با عارضه QT prolongation، استفاده شود.
- « مصرف محلول خوراکی بیلاستین در کودکان زیر ۶ سال یا وزن کمتر از ۲۰ کیلوگرم مجاز نمی‌باشد.
- « در صورت مشاهده ذرات در محلول خوراکی از مصرف آن خودداری کنید.

بارداری و شیردهی:

- « در صورت بارداری یا شیردهی و یا اگر احتمال بارداری وجود دارد یا قصد بارداری دارید، پیش از مصرف این دارو با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.

مقدار و نحوه مصرف:

- « دارو را یک ساعت قبل از دو ساعت بعد از غذا یا آب میوه مصرف کنید.
- « اگر دوز روزانه فراموش شد، به محض یادآوری مصرف شود و دوز بعدی در زمان معمول طبق دستور پزشک مصرف شود.
- « برای چیران دوز فراموش شده نباید دوبرابر مصرف شود.
- « در صورت اختلال در عملکرد کلیوی یا کبدی با پزشک مشورت شود.
- « محلول خوراکی با پیچانه مدرج ۴ میلی‌لیتری (معادل ۱۰ میلی‌گرم بیلاستین در هر دوز) همراه است که به شما در مصرف دوز صحیح کمک می‌کند.
- « جهت مصرف دارو از پیچانه مدرج استفاده شود.
- « مقدار مصرف هر دارو توسط پزشک تعیین می‌گردد اما دستور مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

اختلالات آلرژیک (التهاب ملتحمه بینی و گهی):

- « کودکان ۶ تا ۱۱ ساله (وزن بدن حداقل ۲۰ کیلوگرم): ۴ میلی‌لیتر (۱۰ میلی گرم بیلاستین) یک بار در روز
- « بزرگسالان و نوجوانان ۱۲ سال و بالای ۱۲ سال: ۸ میلی‌لیتر (۲۰ میلی گرم بیلاستین) یک بار در روز

عوارض جانبی:

- « هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود؛ اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود؛ در صورت بروز عوارض زیر و یا هرگونه عارضی دیگر، با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- « عوارض نیازمند مراقبت پزشکی، در صورت بروز واکنش‌های آلرژیک مانند مشکل در تنفس، سرگیجه، افتادن یا از دست دادن هوشیاری، تورم صورت، لبها، زبان یا گلو و یا تورم و قرمزی پوست، درمان را متوقف و با پزشک تماس گرفته شود.
- « عوارض رایج، سردرد، سرگیجه
- « عوارض غیر رایج، نوار قلب غیر طبیعی، ضربان قلب نامنظم، تغییرات در عملکرد کبد و کلیه، اختلال در خواب، اضطراب، خستگی، سرگیجه، دل درد، افزایش اشتها، افزایش وزن، حالت تهوع، اسهال، التهاب معده، سوزش، تشنگی، احساس ضعف، تنگی نفس، خشکی دهان، یبوی خشک یا ناراحت کننده، خارش، تبخال در دهان، تب، وزوز گوش، افزایش چربی خون

تداخلات دارویی:

- « اگر داروی دیگری مصرف می‌کنید یا ممکن است مصرف کنید، پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید.
- « داروهای که ممکن است با بیلاستین تداخل داشته باشند؛
- « سیکلوسپورین، اریترمایسین، کلوتنازول، ریتوناویر، ریمایسین، دیلتیازم، لورازپام

شرایط نگهداری:

- « دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- « پس از باز شدن درب بطری، محصول تا ۶ ماه قابل استفاده است.

ساخت شرکت داروسازی پور سینا
تهران - ایران

