

105 mm

142 mm

Bilastine Tablet

Bilastine solid dosage forms are presented as 10mg orally disintegrating tablets (ODT) and as 20 mg uncoated oral tablets; 10 tablets per blister pack, 3 blister with a leaflet in a box.

Category: Antihistamine (H1-Receptor)

Precautions and warnings:

- If there is allergic history (such as anaphylactic reactions) to Bilastine or other antihistamines, stop taking Bilastine.
- Talk to doctor or pharmacist before using this tablet if there is moderate or severe renal impairment.
- Precaution is necessary before driving or operating machinery.
- Always use this medicine exactly as doctor or pharmacist has told.
- Bilastine should not be used in patients with a history of QTc prolongation like patients with history of cardiac arrhythmias; hypokalemia; hypomagnesaemia; significant bradycardia; family history of sudden cardiac death; concomitant use of other QT/QTc-prolonging drugs.
- Do not give Bilastine to children under 6 years old with a body weight below 20 kg.

Pregnancy and breast-feeding:

Bilastine is not recommended during pregnancy and breast-feeding. If you are pregnant or breast-feeding, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Dosage and administration:

- Take the tablet one hour before or two hours after taking food or fruit juice.
- If you forget to take the daily dose on time, give it on the same day as soon as you remember. Then, give the next dose on the next day at the usual time as prescribed by the doctor. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.
- If you are suffering from kidney or liver disorders, consult the doctor.
- The orally disintegrating tablet is to be placed in the mouth where it disperses rapidly in saliva, so it can be easily swallowed.
- Alternatively, the orodispersible tablet may be dispersed in a tea-spoon of water before administration. It has to be ensured that no rest of sediment remains in the spoon. Grapefruit juice or any other fruit juices should not be used for dispersion.

Dosage of each drug is determined by doctor, but the usual dosage of Bilastine is as follows:

Allergic disorders (rhinoconjunctivitis and urticaria):

- Children 6 to 11 years old (body weight of at least 20 kg): 10 mg Bilastine (1 orodispersible tablet) once a day
- Adults and adolescents (12 years and over 12 years of age): 20 mg Bilastine (1 oral tablet; 2 orodispersible tablets) once a day

Adverse reactions:

- Like all medicines, this medicine may cause unwanted side effects. In case of the following side effects, consult with the pharmacist or doctor:
- Those need for medical attention: Stop treatment and contact doctor if you have allergic reactions like difficulty in breathing, dizziness, collapsing or losing consciousness, swelling of your face, lips, tongue or throat, and/or swelling and redness of the skin.
- Common: Headache; drowsiness
- Uncommon: Abnormal ECG heart tracing, irregular heartbeat; changes in liver or kidney function; dizziness, anxiety, tiredness, feeling of weakness, difficulty in sleeping; stomach pain, increased appetite, increased weight, nausea, indigestion, diarrhea, gastritis, thirst; dyspnea; dry or uncomfortable nose, dry mouth; itching; oral herpes; fever; tinnitus; increased blood fat

Drug interactions:

- Inform your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.
- Medicines which may interact with Bilastine: Cyclosporine; Erythromycin; Ketoconazole; Ritonavir; Rifampicin; Diltiazem; Lorazepam

Storage:

Store below 30° C, protect from light and moisture.



قرص بیلاستین

بیلاستین به شکل

قرص‌های بازشونده در دهان حاوی ۱۰ میلی‌گرم بیلاستین و قرص‌های خوراکی حاوی ۲۰ میلی‌گرم بیلاستین ارائه می‌شوند. ۱۰ قرص در هر پلیستر و ۳۰ پلیستر همراه با برگه راهنما در یک جعبه بسته بندی می‌شود.

دسته دارویی: آنتی هیستامین (گیرنده H₁)

هشدارها و احتیاطات:

- « در صورت سابقه حساسیت به بیلاستین یا سایر آنتی هیستامین‌ها (مانند واکنش‌های آنافیلاکتیک) باید مصرف بیلاستین قطع و به پزشک یا داروساز اطلاع داده شود.
- « در صورت نارسایی کلیوی متوسط تا شدید یا مصرف سایر داروها، پیش از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- « هنگام مصرف این دارو، از رانندگی و فعالیت‌های نیازمند هوشیاری کامل، خودداری نمایید.
- « دارو باید دقیقاً طبق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- « بیلاستین نباید در بیماران با سابقه QT prolongation مانند افراد با سابقه آریتمی قلبی، هایپوکالمی، هایپومنیزمی، پرادی کاردی شدید؛ سابقه خانوادگی ایست ناگهانی قلبی؛ مصرف همزمان سایر داروهای تشدیدکننده QT prolongation، استفاده شود.
- « بیلاستین در کودکان زیر ۶ سال با وزن کمتر از ۲۰ کیلوگرم نباید تجویز گردد.

بارداری و شیردهی:

مصرف بیلاستین در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود. در صورت بارداری یا شیردهی یا اگر احتمال بارداری وجود دارد یا قصد بارداری دارید، پیش از مصرف این دارو با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.

مقدار و نحوه مصرف:

- « دارو را یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا یا آب میوه مصرف کنید.
- « اگر دوز روزانه فراموش شد، به محض یادآوری مصرف شود و دوز بعدی در زمان معمول طبق دستور پزشک مصرف شود. برای جبران دوز فراموش شده نباید دوبرابر مصرف شود.
- « در صورت اختلال در عملکرد کلیوی یا کبدی با پزشک مشورت شود.
- « قرص بازشونده در دهان برای اینکه در بزاق پراکنده شود، در دهان قرار گرفته و سپس به راحتی بلعیده می‌شود. همچنین می‌توان پیش از مصرف، آن را در یک قاشق چای‌خوری آب پراکنده کرد به گونه‌ای که هیچ رسوبی در قاشق باقی نماند. دقت شود برای اختلال از آب گریز فروت یا هر آب میوه دیگری استفاده نشود.
- « قرص خوراکی با یک لیوان آب بلعیده شود.
- « مقدار مصرف هر دارو توسط پزشک تعیین می‌گردد اما دستور مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

اختلالات آلرژیک (التهاب ملتحمه بینی و کتیر)؛

- « کودکان ۶ تا ۱۱ ساله (وزن بدن حداقل ۲۰ کیلوگرم): ۱۰ میلی‌گرم بیلاستین (۱ قرص بازشونده در دهان) یک بار در روز
- « بزرگسالان و نوجوانان (۱۲ سال و بالای ۱۲ سال): ۲۰ میلی‌گرم بیلاستین (۱ قرص خوراکی یا ۲ قرص بازشونده در دهان) یک بار در روز

عوارض جانبی:

- « هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود؛ اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود؛ در صورت بروز عوارض زیر و یا هرگونه عارضه دیگر، با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- « عوارض نیازمند مراقبت پزشکی، در صورت بروز واکنش‌های آلرژیک مانند مشکل در تنفس، سرگیجه، افتادن یا از دست دادن هوشیاری، تورم صورت، لبها، زبان یا گلو و یا تورم و قرمزی پوست، درمان را متوقف و با پزشک تماس گرفته شود.
- « عوارض رایج؛ سردرد، سرگیجه
- « عوارض غیر رایج؛ دوار قلب غیر طبیعی، ضربان قلب نامنظم، تغییرات در عملکرد کبد و کلیه، اختلال در خواب، اضطراب، خستگی، سرگیجه، دل درد، افزایش اشتها، افزایش وزن، حالت تهوع، اسهال، التهاب معده، سو، هاضمه، تشنگی، احساس ضعف، تنگی نفس، خشکی دهان، بیثباتی خشک یا ناراحت کننده، خارش، تبخال در دهان، تب، زور گوش، افزایش چربی خون

تداخلات دارویی:

- « اگر داروی دیگری مصرف می‌کنید یا ممکن است مصرف کنید، پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید.
- « داروهایی که ممکن است با بیلاستین تداخل داشته باشند؛ سیکلوسپورین، اریتروماisin، کتوکونازول، ریتوناویر، ریفاامپسین، دیلتیازم، لورازپام

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

