

قرص بیزاکودیل

این دارو به صورت قرص‌های حاوی ۵ میلی‌گرم ماده مؤثره بیزاکودیل تولید و در بسته بندی های ۱۰۰ عددی به همراه یک بروشور عرضه می گردد.

موارد مصرف دارو:

بیزاکودیل از دسته داروهای ملین بوده و در درمان یبوست برای کوتاه مدت و تخلیه روده‌ها پیش از عکس برداری و یا جراحی استفاده می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

۱- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در دوران بارداری یا شیردهی

- کودکان

- در صورت داشتن درد معده، تهوع، استفراغ، یا تغییر ناگهانی در حرکات روده قبل از مصرف

۲- هنگام مصرف دارو به موارد زیر توجه نمایید:

- دارو را به صورت منظم و به مقدار تجویز شده مصرف نمایید.

- به مدت ۱ ساعت پس از مصرف این دارو، شیر یا هر فرآورده لبنی دیگر و یا داروهای ضد اسید را مصرف نکنید.

- قرص را بطور کامل بلعیده و از جویدن یا له کردن آن خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

در صورت داشتن انسداد روده (ایلئوس)، حساسیت به بیزاکودیل، کم آبی شدید، عدم تحمل یا عدم هضم لاکتوز، مشکلات شکمی جدی مانند آپاندیسیت یا درد شدید شکم همراه با حالت تهوع و استفراغ و التهاب روده (روده کوچک یا بزرگ) و کودکان با کمتر از ۳ سال سن.

نکته: مصرف بیش از اندازه از این دارو ممکن است سبب اسهال و برهم خوردن الکترولیت‌های بدن به خصوص در کودکان شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی تنها با تجویز پزشک متخصص صورت گیرد.

هشدارها و احتیاطات:

- پزشک خود را در جریان روند بهبودی قرار دهید.
- در صورت نیاز به استفاده از این قرص بیش از ۱ هفته، مصرف را قطع کنید و با پزشک یا داروساز مشورت نمایید زیرا استفاده بیش از ۱ هفته ممکن است باعث ناراحتی معده، غش، سوزش رکتوم و گرفتگی خفیف عضلات شود.
- اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، بلافاصله پس از یادآوری آن را میل نمایید ولی اگر تقریباً زمان نوبت بعدی فرا رسیده باشد، نوبت بعدی را طبق معمول میل نموده و مقدار آن را دو برابر نکنید.
- عدم تأثیر گذاری بیزاکودیل و همچنین ممنوعیت مصرف این دارو جهت کاهش وزن.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

● درمان یبوست

- بزرگسالان:

در صورتی که پیش از این بیزاکودیل توسط بیمار به عنوان ملین استفاده نشده است، برای آغاز یک عدد قرص ۵ میلی‌گرم قبل از خواب مصرف شود و در صورت نیاز تا سه عدد (۱۵ میلی‌گرم) قابل افزایش می‌باشد. هنگامی که دفع به حالت عادی بازگشت، مصرف دارو می‌تواند متوقف شود. در صورت نیاز می‌توان دوز را تا ۴ عدد قرص (۲۰ میلی‌گرم) در یک روز افزایش داد.

- کودکان:

- برای کودکان زیر سه سال بیزاکودیل توصیه نمی‌شود و صرفاً با تجویز پزشک قابل مصرف می‌باشد.

- کودکان ۱۰ سال تا ۱۲ سال: ۵ تا ۱۰ میلی‌گرم یکبار در روز

- کودکان بالاتر از ۱۲ سال: ۵ تا ۱۵ میلی‌گرم یکبار در روز

نکته: پس از بهبود یبوست، مصرف دارو قطع شود.

● تخلیه روده‌ها پیش از عکسبرداری یا جراحی:

بزرگسالان: ۲ عدد قرص (۱۰ میلی‌گرم) دو بار در روز، صبح و عصر روز قبل از عکسبرداری یا جراحی.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولیکن در صورت بروز عوارض زیر یا هرگونه عارضه دیگری، با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

با این وجود لازم به ذکر است که از این دارو عوارض جانبی خاصی گزارش نشده است؛ همچنین از برخی مطالعات بالینی، به عنوان عوارض جانبی گزارشاتی دریافت شده‌است مانند: دردهای شکمی دستگاه گوارشی، اسهال، نفخ شکم، کولیت ایسکمیک و سر درد.

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه‌شده سریع‌ب‌پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه‌نمایید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر، پیش از مصرف بیزاکودیل با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

- گلیکوزیدهای قلبی مانند دیگوکسین
- داروهای مدر مانند فوروزماید
- داروهای استروئیدی مانند پردنیزولون
- هرگونه داروی ملین

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

ساخت شرکت داروسازی پورسینا تهران - ایران

Bisacodyl tablet

How Supplied:

Bisacodyl F.C. tablets are presented as forms containing 5 mg Bisacodyl; The tablets are available in packs of 100 in PVC/Aluminium blister strips with a leaflet.

Category:

Bisacodyl is a laxative medicine used to treat: Constipation and bowel clearance before radiological procedures and surgery.

Administration:

Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Administer with water and swallow whole tablet; do not break, chew, or crush; do not administer within 1 hour of antacids, milk, or dairy products.

Dosage and Administration:

Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Constipation:

Usual adult dose:

- Take 5 to 15 mg once daily before bedtime. If you have not taken Bisacodyl 5mg laxative tablets before, start with one tablet and increase to two if necessary. When the bowel regularity has returned to normal, the dose can usually be stopped.

Bowel cleansing:

Bowel cleansing prior to rectal examination:

Adults: 2 tablets (10 mg) twice a day, morning and evening before imaging or surgery.

Pediatrics:

The usual dose for children is:

- Children under 3 years: Bisacodyl tablets are not recommended for children under 3 years.
- Children 3 to under 10 years: Limited data available.
- Children 10 to under 12 years: 5 to 10 mg once daily.
- Children over 12 years and adolescents: 5 to 15 mg once daily.

Adverse reactions:

Bisacodyl as like as other medicines, can cause side effects; although it doesn't appear for everybody.

If you get any side effects, including not listed in this leaflet, talk to your doctor or pharmacist.

It should also be noted that there are no adverse reactions listed in the manufacturer's labeling. But also there are some post marketing adverse reactions that have been reported like: Gastrointestinal abdominal pain, diarrhea, flatulence, ischemic colitis and headache.

Precautions:

- Do not chew or crush; do not use if you cannot swallow without chewing.
- Do not administer within 1 hour after taking an antacid, milk, or any dairy products.
- Consult a health care provider prior to use if stomach pain, nausea, vomiting, or a sudden change in bowel movements lasting more than 2 weeks occurs, or if you have already used a laxative, including Bisacodyl.
- Using more than 1 week may cause stomach discomfort, rectal burning, and mild cramps.
- Discontinue use and consult a health care provider if use of this tablet is needed more than 1 week.

Do not take Bisacodyl 5mg tablets if you have: Bowel condition called (ileus) (blockage in the intestine), allergy to Bisacodyl, severe dehydration, intolerant to or cannot digest lactose, serious abdominal condition such as appendicitis or severe abdominal pain with nausea and vomiting, blocked bowel (intestinal obstruction) and inflammation of the bowel (small or large intestine).

Drug interactions:

Antacids should not be used within 1 hour before Bisacodyl administration because of possible diminishing of the therapeutic effect of Bisacodyl.

Inform your doctor if you are taking any of the following medicines: Furosemide, Prednisolone, other laxative medicines.

Pregnancy and breast feeding:

If you are pregnant, breast-feeding or there is possibility of being pregnant or there is a planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Use of Bisacodyl should be limited during pregnancy due to an increased risk of adverse events, such as electrolyte imbalance. When dietary changes and lifestyle modifications are insufficient, agents other than Bisacodyl are recommended for the treatment of constipation in pregnant women.

Storage:

Store below 30°C, Protect from light and moisture.

Keep out of the reach of children.