

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می‌باشد:

بزرگسالان

ناراسیای احتقانی قلب: در ابتدا ۳/۱۲۵ میلی‌گرم دوز، در روز به مدت ۲ هفته، همراه با غذا، در صورت تحمل بیمار، دوز دارو به ۶/۲۵ میلی‌گرم دوز، در روز افزایش می‌یابد. سپس این مقدار به تشخیص پزشک می‌تواند هر دو هفته یکبار، دو برابر شود تا به بالاترین دوز قابل تحمل بیمار برسد.

نکته: در هر نوبت افزایش دوز، بیمار باید به مدت یک ساعت از لحاظ علائم سرگیجه یا سبکی سر، زیر نظر گرفته شود. حد معمول تجویز بزرگسالان: در بیمارانی با وزن کمتر از ۸۵ کیلوگرم، ۲۵ میلی‌گرم دو بار در روز و در افراد با وزن بالای ۸۵ کیلوگرم، ۵۰ میلی‌گرم دو بار در روز می‌باشد.

فشار خون بالا: در ابتدا ۶/۲۵ میلی‌گرم، دوز، در روز همراه با غذا، این دوز باید به مدت ۷ تا ۱۴ روز حفظ شود و سپس در صورت تحمل بیمار و تشخیص پزشک می‌تواند به ۱۲/۵ میلی‌گرم دو بار در روز افزایش یابد، همچنین در صورت عدم کنترل فشارخون مقدار مصرف را می‌توان به ۲۵ میلی‌گرم دوز، در روز، در صورت تحمل بیمار، افزایش داد. دوز نگهدارنده: ۶/۲۵ میلی‌گرم دوز در روز می‌باشد. اثرات کامل ضد پر فشاری خون طی ۷ تا ۱۴ روز بروز می‌کند. حد معمول تجویز بزرگسالان: ۲۵ میلی‌گرم دو بار در روز می‌باشد.

درمان اختلال عملکرد بطن چپ (پس از حمله قلبی): در ابتدا ۶/۲۵ میلی‌گرم دوز، در روز، بعد از ۳ تا ۱۰ روز بنا بر تحمل بیمار دوز مصرفی به ۱۲/۵ میلی‌گرم دو بار در روز افزایش می‌یابد و در انتها دوز مورد نظر به مقدار ۲۵ میلی‌گرم دوز، در روز خواهد رسید. کمترین مقدار دوز اولیه، ۳/۱۲۵ میلی‌گرم دو بار در روز است. در صورت عدم تحمل بیمار دوز نگهدارنده باید روی دوز پایین باقی بماند.

کودکان

ایمنی و اثر بخشی این دارو در افراد زیر ۱۸ سال مشخص نشده است.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شوند، ولیکن در صورت بروز هر عارضه‌ای با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارضی که در صورت بروز بلافاصله نیاز به توجه پزشکی دارند: حساسیت، شدن شدن ضربان قلب، درد قفسه سینه، سرگیجه، تنگی نفس، ادم عمومی و محیطی، افت فشارخون با علائم سرگیجه و سبکی سر، از حال رفتن، افزایش وزن که ممکن است نشانه احتباس مایعات در بدن باشد، وجود ایبومین در ادرار، از بین رفتن قلبی، انسداد دهلیزی - بطنی، تری دید، افسردگی، تیره شدن رنگ ادرار، تب، تفرس، وجود خون در ادرار، افزایش سطح کلسترول خون، افزایش یا کاهش قند خون، افزایش سطح پتاسیم خون، افزایش فشار خون، افزایش سطح اسید اوریک خون، کاهش و یا ازدیاد غیر طبیعی حجم پلاسمای خون، کاهش سدیم خون، تپش قلب، ناراسیای کلیه و اختلال در پلاکت‌های خون

عوارضی که در صورت تداوم و یا بدتر شدن نیاز به توجه پزشکی دارند: درد کمر، اسهال، خستگی، گرگز یا بی‌حسی اندام‌ها، درد شکمی، درد شکمی، سردرد، کاهش ادراک حسی لامسه، بی‌خوابی، خشکی چشم، درد عضلانی، بی‌قراری، گرفتگی عضلات، تهوع و استفراغ، اختلال عروق محیطی، تعریق زیاد، کاهش وزن. در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

قرص کارودیلول

این دارو به صورت قرص‌های روکش‌دار خط‌دار، حاوی ۶/۲۵، ۱۲/۵ و ۲۵ میلی‌گرم ماده مؤثره کارودیلول تولید و در بسته‌بندی‌های ۳۰ یا ۱۰۰ عددی به همراه یک بروشور ارائه می‌شود.

موارد مصرف دارو

پایین آورنده فشار خون، درمان کمکی در ناراسیای قلبی

راهنمای‌های عمومی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در دوران بارداری و شیردهی
- در صورت مصرف داروهای دیگر به خصوص داروهای ضد دیابت سولفونیل اوره مانند گلی بن گلایمید، داروهای مسدودکننده کانال کلسیم به خصوص وراپامیل و دیلتیازم، سیکلوسپورین و آسولین
- در صورت ابتلا به سایر بیماری‌ها به خصوص آسم، کندی ضربان قلب، ناراسیای قلبی، نقص عملکرد کبد، دیابت، پرکاری تیروئید
- در هنگام مصرف دارو به موارد زیر توجه فرمایید:
- اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید بلافاصله پس از یادآوری آن را میل نمایید، ولی اگر تقریباً زمان نوبت بعدی رسیده باشد، نوبت بعدی را طبق معمول میل نموده و مقدار آن را دو برابر نکنید.
- شرایط نگهداری صحیح دارو را رعایت کنید.

منع مصرف دارو

در صورت داشتن سابقه حساسیت به این دارو، سایر داروهای مشابه و یا رنگ‌ها با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

مصرف این دارو در دوران بارداری تنها زمانی مجاز است که سودمندی آن نسبت به زیان برای جنین ثابت گردد. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود، مگر به تشخیص پزشک متخصص.

احتیاطات و هشدارها

- پزشک خود را در جریان روند بهبودی قرار دهید.
- از مصرف داروهای دیگر بدون تجویز پزشک خودداری نمایید.
- دارو را همراه با غذا و در زمان مشخص شده‌ای از روز میل نموده و بدون مشورت با پزشک مصرف آن را قطع نکنید.
- مصرف این دارو ممکن است موجب سرگیجه یا سبکی سر شود، لذا حین رانندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند احتیاط نمایید. همچنین هنگام برخاستن ناگهانی، به علت احتمال افت فشارخون و سرگیجه احتیاط نمایید.
- افراد دیابتی در صورت مشاهده تغییر در غلظت قندخون و همچنین افرادی با ناراسیای احتقانی قلب، در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش وزن یا تنگی نفس حتماً به پزشک مراجعه نمایند.
- افرادی که از لنزهای تماسی استفاده می‌کنند، در صورت کاهش ترشح اشک با پزشک خود مشورت کنند.
- قبل از انجام هرگونه عمل جراحی (شامل جراحی دندان) یا درمان‌های اورژانسی پزشک خود را از مصرف دارو مطلع سازید.
- مصرف این دارو در افرادی با ناراسیای شدید کبدی توصیه نمی‌شود.

تداخلات دارویی

در صورت مصرف سایر داروها به خصوص داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید: داروهای بی‌هوشی عمومی مانند سیکلوروپان، اثر، تری کلرواتیلن، داروهای ضد دیابت از نوع سولفونیل اوره مانند گلی‌بن گلایمید، آسولین، مسدودکننده‌های کانال کلسیم نظیر وراپامیل و دیلتیازم، داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز، زورین، کلونیدین، سیکلوسپورین، دیگوکسین، الفلکاندهای آنزیم کبدی سیتوکروم P450 مانند ریگامپین، مهارکننده‌های آنزیم کبدی سیتوکروم P450 مانند ساسیتیدین، پاروکستین، پروپافنون، کینیدین و اریترومايسين. **مقدار و نحوه مصرف**