

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر و یا هرگونه عارضه‌ی دیگر، با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

توجه: در صورت بروز واکنش آلرژیک مانند تورم گلو یا زبان و صورت، مشکل در تنفس یا سرگیجه، برونکواسپاسم، سندرم استیون جانسون، تنگی نفس یا سرفه خشک به دلیل التهاب ریه‌ها، درمان را متوقف کرده و بلافاصله با پزشک تماس بگیرید.

● راجع:

سردرد، سرگیجه، یبوست، اسهال.

● غیر راجع:

احساس بیماری، درد شکم، نفخ، خستگی، دهان خشک، از دست دادن اشتها، اختلال چشایی، خارش شدید، بثورات جلدی، افزایش آنزیم‌های کبدی در خون، کاهش گلبول‌های سفید و پلاکت‌ها.

تداخلات دارویی:

اگر داروی دیگری مصرف می‌کنید یا ممکن است مصرف کنید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

داروهای زیر با فاموتیدین تداخل دارند:

● آنتی اسیدها (با فاصله ۲ ساعت از فاموتیدین تجویز شود).

● پروپنسید

● آتانازول

● کربنات کلسیم که به عنوان دارو برای بیماران با سطوح بالای فسفات در افرادی که دیالیز می‌شوند، تجویز می‌شود.

● ایتراکانازول و کتوکونازول (۲ ساعت قبل از فاموتیدین تجویز شود).

● سوکرافیت

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور، رطوبت و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی پورسینا تهران - ایران

قرص فاموتیدین

هر قرص روکش‌دار این دارو حاوی ۲۰ یا ۴۰ میلی‌گرم فاموتیدین می‌باشد، ۱۰ عدد قرص در یک بلیستر قرار گرفته و در بسته‌بندی‌های ۳۰ یا ۱۰۰ عددی به همراه یک بروشور ارائه می‌شود.

دسته دارویی:

آنتاگونیست گیرنده‌های H_2 هیستامین

هشدارها و احتیاطات:

در موارد زیر پیش از مصرف فاموتیدین پزشک یا داروساز خود را مطلع کنید:

- در صورت سابقه حساسیت به فاموتیدین، سایر H_2 بلاکرها یا رنگ‌های خوراکی.

- در دوران حاملگی یا شیردهی

- بیماران دارای آسیب‌های کبدی یا کلیوی

بارداری و شیردهی:

مصرف قرص فاموتیدین در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود، مگر به تشخیص پزشک معالج.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو توسط پزشک تعیین می‌گردد اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

بزرگسالان و نوجوانان:

- زخم معده و دوازدهه:

۴۰ میلی‌گرم یک بار در روز در هنگام خواب برای ۴ تا ۸ هفته

دوز مصرفی توصیه شده برای زخم‌های مکرر ۲۰ میلی‌گرم در هنگام خواب

- سندرم زولینگر-الیسون:

دوز مصرفی توصیه شده ۲۰ میلی‌گرم هر شش ساعت است که باید در ادامه تنظیم شود.

- برگشت اسید از معده به مری (ریفلاکس ازوفازیت):

علائم خفیف: ۲۰ میلی‌گرم دو بار در روز با طول درمان ۶ تا ۱۲ هفته.

علائم خفیف تا متوسط: ۴۰ میلی‌گرم دو بار در روز با طول درمان ۶ تا ۱۲ هفته.

توجه: اگر از اختلالات کلیوی و کبدی رنج می‌برید، احتمالاً نیاز به تنظیم دوز خواهید داشت.

Famotidine Tablet

How supplied:

Famotidine F.C tablets are presented as forms containing 20 and 40 mg Famotidine; 10 tablets per blister pack, 10 blisters with a leaflet in a box.

Category:

Histamine (H_2 receptor) antagonist

Precautions and warnings:

Talk to your doctor or pharmacist before taking Famotidine if you:

- Have allergy history to Famotidine, other H_2 blockers or food colors.
- Are pregnant or breast-feeding.
- Suffering from kidney or liver disease.

Pregnancy and breast-feeding:

Famotidine is not recommended during pregnancy or breast-feeding. If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Dosage and administration:

Dosage of each drug is determined by doctor, but the usual dosage of Famotidine is as follows:

Adult and adolescent:

- Stomach and duodenal ulcer:
40mg once daily at night for 4 - 8 weeks.

For recurrent ulcer, the recommended dose is 20mg at night.

- Zollinger–Ellison syndrome:

The recommended dose is 20mg every six hours. The dosage should then be adjusted.

- Reflux esophagitis:

Mild symptoms: 20mg twice a day for 6 to 12 weeks.

Mild to moderate symptoms: 40mg twice a day for 6 to 12 weeks.

142.0 mm

Note: If you have liver and kidney diseases, you may need to adjust the dose.

Adverse reactions:

All medicines may cause unwanted side effects, in case of the following side effects, consult with the pharmacist:

Note: Stop treatment and contact a doctor at once if you have allergic reactions like swelling of the face and throat or tongue, difficulty in breathing or dizziness, bronchospasm, Steven Johnson syndrome, shortness of breath or dry cough due to inflammation of the lungs.

• Common:

Headache; dizziness; constipation; diarrhea.

• Uncommon:

Feeling sick; abdominal pain; flatulence; tiredness; dry mouth; loss of appetite; taste disorder; severe itching; rash; increase in liver enzymes in blood; reduction in white blood cells and platelets.

Drug interactions:

Tell your doctor or pharmacist if you are taking or might take any other medicines.

Medicines which may interact with Famotidine:

- Antiacids (Famotidine should be administered 1-2 hours before these medicines)
- Probenecid
- Atazanavir
- Calcium carbonate as medicine for high phosphate level in patients on dialysis.
- Itraconazole and Ketoconazole (Famotidine should be administered 2 hours after these medicines)
- Sucralfate

Storage:

Store below 30°C, protect from moisture, light and keep out of reach of children.

Manufactured by Pursina Pharmaceutical Co. Tehran-Iran



پورسینا
PURSINA