

دید نمی شود؛

در صورت بروز هر یک از موارد زیر، مصرف دارو را متوقف کرده و به بیمارستان مراجعه کنید:

• آنفیلاکسی (مانند خس خس سینه و درد یا گرفتگی قفسه سینه، درد شکمی، نبض ضعیف یا تند، مور مور شدن دست ها و پاها، حالت تهوع، اسهال و یا استفراغ)، آنژیوادم (تورم پلک ها، صورت، لب ها، زبان یا گلو)، برونگو اسپاسم (تنگی شدید نفس-احساس خفگی-سرفه مکرر-احساس فشار در قفسه سینه-خستگی زودرس)

در صورت بروز هر یک از موارد زیر، مصرف دارو را متوقف کرده و فوراً با پزشک خود مشورت کنید:

• استفراغ خونی، خونریزی بینی بی دلیل، درد قفسه سینه، تشنج، غش، زخم یا خونریزی دستگاه گوارش ومشکلات خونی.

سایر عوارض جانبی:

• اختلال تکلم، توهم، مننژیت آسپتیک، میگرن، تغییرات خلقی یا روانی، نوروپاتی محیطی، غش، التهاب پوست، سندرم استیونز-جانسون، التهاب و تورم روده بزرگ، اختلال بلع، التهاب مری، ورم معده، دفع کریستال از طریق ادرار، سوزش یا عفونت دستگاه ادراری، کم خونی یا کاهش انعقاد خون، هپاتیت، التهاب رگ های خونی، تب، آبریزش بینی، شل شدن یا شکافتن ناخن ها، تورم غدد لنفاوی، مشکلات بینایی، التهاب دهان و یا زبان، مشکلات شنوایی یا وزوز گوش، پانکراتیت، تورم غیر طبیعی دست ها و پاها، هیپرکالمی، تکرر ادرار، اختلال یا نارسایی کلیوی

تداخلات دارویی:

اگر داروی دیگری مصرف می کنید، اخیراً مصرف کرده اید یا ممکن است مصرف کنید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

داروهای زیر با این دارو تداخل دارند:

• مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین؛ آسپرین؛ لیتوم؛ داروهای ادرارآور؛ متوترکسات؛ وارفارین؛ سیکلوسپورین؛ پروپنسید؛ هپارین؛ سفامندول؛ سفوپرازول؛ سفوتتان؛ پلیکامایسین؛

تداخلات دارو و تست های آزمایشگاهی؛

• این دارو ممکن است سبب کاهش تجمع پلاکتی و افزایش زمان خونریزی شود، بنابراین هنگام بررسی آزمایشگاهی یا پارامترهای انعقادی خون باید این اثر را در نظر گرفت.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارو را دو اید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی پور سینا

تهران- ایران



ناپروکسین®

قرص پیوسته رهش ناپروکسین

این دارو به صورت قرص های پیوسته رهش حاوی ۷۵۰ میلی گرم ماده موثره ناپروکسین تولید و در قوطی های ۲۰ عددی به همراه یک بروشور در جعبه ارائه می گردد.

دسته دارویی:

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs)

هشدار ها و احتیاطات:

در موارد زیر از مصرف این دارو خودداری کنید:

• سابقه یا ابتلا به مشکلات معده مانند زخم یا خونریزی (همراه یا بدون مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی)، کلیوی، کبدی، حملات قلبی، درد قفسه سینه، بیماری یا نارسایی قلبی، سکنه مغزی، آسم، کهیر، تورم سینوس ها یا واکنش های آلرژیک (بسی از مصرف استیل سالیسیلیک اسید (ASA) یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی)، بیماری های التهابی روده (بیماری کرون یا التهاب روده)، سطح بالای پتاسیم خون

• حساسیت به ناپروکسین، آسپرین، سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی یا سایر داروهای مسکن.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری یا شیردهی توصیه نمی شود؛ در صورت بارداری یا شیردهی، احتمال و یا قصد بارداری، پیش از مصرف این دارو با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.

مقدار و نحوه مصرف:

• دارو را دقیقاً همانطور که پزشک تجویز کرده است، مصرف کنید و به افراد دیگر، حتی افرادی که علائم مشابه شما دارند، نیز توصیه نکنید.

• دارو به طور کامل، بدون جویدن یا خرد کردن، ترجیحاً همراه با غذا مصرف شود.

• اگر یک دوز دارو را فراموش کردید، تا زمان مصرف دوز بعدی آن صبر کنید و بیش از یک دوز از آن را در یک زمان مصرف نکنید.

• تنظیم دوز دارو برای افراد مسن یا مبتلایان به بیماری های کبدی یا کلیوی باید توسط پزشک معالج انجام گیرد و در افراد زیر ۱۶ سال از مصرف این دارو خودداری شود.

مشکلات عضلانی، مفاصل یا تاندون، درد قاعدگی، آرتрит و رماتیسم ستون فقرات:

• بزرگسالان ۱۶ سال و بالاتر:

پزشک بر اساس شرایط و نوع بیماری در مورد بهترین دوز تصمیم می گیرد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد

pantone: u187

142 mm

Naproxina®

Naproxen ER tablet

Each Naproxina® (Extended-Release) tablet contains 750 mg Naproxen (as Sodium), there are 20 tablets in a bottle with a leaflet in a box.

Category:

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

Precautions and warnings:

Avoid taking this medicine in the following cases:

- Stomach problems like an ulcer or bleeding (with or without taking NSAIDs), kidney or liver problems, heart attacks, chest pain, heart disease or stroke, asthma, hives, sinus swelling or symptoms of an allergic reaction (by taking Acetylsalicylic acid (ASA) or other NSAIDs), blood high potassium level, inflammatory bowel disease (Crohn's disease or ulcerative colitis)
- Do not take this drug if there is an allergic reaction to Naproxen, Aspirin, other NSAIDs or any other pain relief medicines.

Pregnancy and breastfeeding:

Naproxina® is not recommended during pregnancy or breast-feeding. If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, Inform your pharmacist or physician.

Dosage and administration:

- Take Naproxina® exactly as your doctor has prescribed and do not suggest this medicine to other people, even if they have the same symptoms.
- Swallow the tablet whole. Do not break, crush or chew and it is better to take it with food.
- If you miss a dose, take your next dose at the usual time. Do not double doses.
- Doctor will decide the best dosage for older patients and those with liver or kidney problems and it is not recommended for children under 16 years old.

Muscles, joints or tendons problems and period pain; arthritis and ankylosing spondylitis:

- Adults 16 years and older:

Doctor will prescribe the best dosage for patients based on their condition and problem.

Adverse reactions:

Like all medicines, this medicine can cause side

effects, although not everybody gets them and not all of these side effects can be seen in one person; in case of the following side effects, consult with your physician.

Stopping medication and obtaining emergency treatment if symptoms of any of the following occur:

Anaphylaxis, Angioedema, or Bronchospasm
Stopping medication and checking with physician immediately if symptoms of any of the following occur:

Spitting up blood, unexplained nosebleeds, Chest pain, convulsions, fainting, gastrointestinal ulceration or bleeding, and blood dyscrasias.

Other adverse reactions:

Dysarthria, hallucinations, aseptic meningitis, migraine, mood or mental changes, peripheral neuropathy, syncope, dermatitis, stevens-johnson syndrome, colitis, dysphagia, esophagitis, gastritis, crystalluria, urinary tract irritation or infection, anemia or hypocoagulation, hepatitis, angitis, fever, allergic rhinitis, loosening or splitting of fingernails, lymphadenopathy, vision problems, stomatitis, glossitis, hearing problems or tinnitus, pancreatitis, and, hyperkalemia, polyuria, renal impairment or failure.

Drug interactions:

Inform your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

The following drugs interact with Naproxina®:

- ACE inhibitors; Aspirin; Lithium; Diuretics; Methotrexate; Warfarin; Cyclosporine; Probenecid; Heparin; Cefamandole; Cefoperazone; Cefotetan; Plicamycin; Valproic acid; Corticosteroids; Corticotropin.

Drug-laboratory test interaction:

- Naproxina® may decrease platelet aggregation and prolong bleeding time. This effect should be kept in mind when bleeding times are determined.

Storage:

Store below 30 ° C, protect from light and moisture.

Keep out of reach of children.

Manufactured by Pursina pharmaceutical Co.
Tehran – Iran



105 mm