

پانکراتین

این دارو به صورت قرص های انتریک کتود محتوی (لیپاز ۱۰۵۰۰ واحد FIP، پروتئاز ۶۰۰۰ واحد FIP، آمیلاز ۴۰۰۰ واحد FIP) و ۴۰۰ میلی گرم سایمتیکون تولید شده و در بسته بندی های ۱۰۰ عددی ارائه می شود.

موارد مصرف دارو:

کمک به هضم غذا، ضد نفخ

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

۱- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- دوران بارداری و یا شیردهی
- در صورت ابتلا به آسیب شدید کلیوی، انسداد مجاری صفرا و عفونت کیسه صفرا
- ۲- در هنگام مصرف دارو به موارد زیر توجه نمایید:
- رژیم غذایی توصیه شده توسط پزشک را رعایت نمایید.
- بدون مشورت با پزشک یا داروساز از جایگزینی دارو با داروهای مشابه خودداری نمایید.
- در صورتی که مصرف یک دوز از دارو را فراموش کرده اید و از وعده غذایی شما بیش از ۲ ساعت گذشته است تا وعده غذایی بعدی دارو را مصرف نکنید و دارو را در زمان خود بدون افزایش مقدار مصرف کنید.
- شرایط نگهداری صحیح دارو را رعایت کنید.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به این دارو یا پروتئین های حیوانی، رنگ ها، غذاها یا پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی تنها زمانی مجاز است که نیاز به آن کاملا محرز شده باشد و فوائد حاصله به طور کامل بر زیان احتمالی آن بر جنین برتری داشته باشد، مصرف این دارو باید با احتیاط و با تجویز پزشک صورت گیرد.

هشدارها و احتیاطات:

- پزشک خود را در جریان روند بهبودی قرار دهید.
- قرص را بطور کامل بلعیده و از شکستن و خراش دادن و جویدن آن خودداری نمایید.
- برای جلوگیری از تحریک یا ایجاد زخم در مخاط دهان و زبان، قرص را با آب فراوان میل نمایید.
- در صورت بروز اسهال، درد شکمی و ناراحتی های دیگر گوارشی با پزشک مشورت کنید.
- از مصرف همزمان این دارو با قرص آهن، آنتی اسیدهایی که حاوی کلسیم کربنات و منیزیم هیدروکساید هستند خودداری نمایید.
- دارو را همراه غذا یا بلافاصله قبل یا بعد از غذا و با مقدار زیادی مایعات مصرف نمایید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهایی مانند آنتی اسیدهای حاوی منیزیم هیدروکساید یا کلسیم کربنات، مکمل های آهن و فولیک اسید حتما پزشک خود را مطلع سازید.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است: مقادیر مصرف این دارو بر اساس شدت سوءهاضمه و سوءجذب، مقدار چربی در رژیم غذایی و فعالیت های آنژیومی فرآورده های مختلف متفاوت است، ولی مقدار مصرف معمول این دارو ۱ تا ۳ عدد قرص همراه یا بعد از هر وعده غذایی می باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

- عوارضی که در صورت وقوع بلافاصله نیاز به توجه پزشکی دارند:
- واکنش های آلرژیک، حساسیت و تحریک دهان، انقباض های روده ای، استفراغ، تنگی یا انقباض مجاری داخلی، یبوست، التهاب پوست، تهوع، دفع مدفوع سیاه رنگ، کاهش وزن، درد شدید در شکم و در دوزهای بالا: عوارض گوارشی مانند اسهال، انسداد روده، درد معده، افزایش اسید اوریک در خون و ادرار نیز گزارش شده است.
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از دسترس کودکان، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.