

قرص پرامی پکسول دی هیدروکلراید پیوسته رهش

این دارو در قدرت اثرهای ۰٫۷۵، میلی گرم و ۰٫۵ میلی گرم تولید می شود. ۱۰ قرص در یک پلیستر قرار گرفته و در بسته بندی های ۳۰ عددی به همراه یک برگه راهنما ارائه می گردد.

دسته دارویی:

آگونیست دوپامین

هشدارها و احتیاطات:

- در طول درمان با این دارو از رانندگی و کار با دستگاههایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- این دارو می تواند سبب افت فشارخون وضعیتی شود. بنابراین به بیمار توصیه می شود هنگام برخاستن احتیاط نماید.
- در صورت سابقه حساسیت به قرص پرامی پکسول، از این دارو استفاده نکنید.
- در صورت ابتلا به هرگونه بیماری و یا مصرف هر داروی دیگری، پزشک خود را مطلع نمایید.
- در صورت بروز موارد زیر حتماً پزشک را مطلع کنید تا در صورت صلاح دید دوز دارو را تغییر دهد:
- اختلال حرکتی و کندگی غیرعادی حرکات یا بروز حرکات تکراری مانند تیک، انقباض یا کشیدگی غیرعادی عضلات، خواب آلودگی زیاد یا به خواب رفتن ناگهانی، میل زیاد یا اعتیاد به اعمال پرخطر مانند رفتارهای جنسی کنترل نشده یا قمار و شرط بندی، سرخوشی زیاد یا اختلالات شناختی، هذیان یا توهم های دیداری
- از قطع ناگهانی قرص پرامی پکسول پیوسته رهش بشدت خودداری نمایید، کاهش دوز یا قطع این دارو، بدون مشورت با پزشک می تواند باعث بروز یک وضعیت پزشکی به نام سندرم بدخیم نورولپتیک شود؛ بنابراین، کاهش و قطع دوز این دارو باید به صلاح دید و تحت نظر پزشک انجام گیرد.
- در طول درمان از مصرف همزمان این دارو با فرآورده های حاوی الکل خودداری نمایید.
- مصرف این دارو در کودکان یا نوجوانان زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.
- قرص را بطور کامل بلعید و از جویدن، خرد کردن و تقسیم کردن دارو خودداری نمایید.
- دارو را همراه با بدون غذا فقط میل کنید.
- از مصرف همزمان قرص پرامی پکسول و قرص پرامی پکسول پیوسته رهش خودداری نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف قرص پیوسته رهش پرامی پکسول در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود. در صورت بارداری یا شیردهی و یا اگر احتمال بارداری وجود دارد یا قصد بارداری دارید، پیش از مصرف این دارو با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.

مقدار و نحوه مصرف:

- این دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید. اگر از نحوه مصرف آن مطمئن نیستید، باید با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
- اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، فقط نوبت بعدی را در زمان معمول مصرف کنید و برای جبران دوز فراموش شده، دوز را دو برابر مصرف نکنید.

پارکینسون: سندرومی بی بی قرار (RLS)

- بزرگسالان (بالای ۱۸ سال):
- دوز معمول مناسب ۱٫۵ میلی گرم در روز است. ولیکن، ممکن است در برخی از بیماران دوز بالاتری تا حداکثر ۴٫۵ میلی گرم در روز مورد نیاز باشد.

عوارض جانبی:

مانند همه داروها، این دارو نیز می تواند عوارض جانبی ایجاد کند، اگرچه در همه افراد این عوارض دیده نمی شود و همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر با داروساز و یا پزشک مشورت کنید:

عوارض جانبی جدی:

- خواب آلودگی، سرگیجه، حالت تهوع، غش کردن، عرق کردن، توهم
- عوارض جانبی رایج در افرادی که در مراحل اولیه پارکینسون هستند:
- خواب آلودگی، حالت تهوع و استفراغ، بیوست، سرگیجه، غش کردن، توهم، خشکی زبان، اسهاس عضلانی و ادما
- عوارض جانبی رایج در افرادی که در مراحل پیشرفته بیماری پارکینسون هستند:
- حرکات غیرارادی، حالت تهوع، بیوست، توهم، سردرد و بی اشتها

تداخلات دارویی:

- اگر داروی دیگری مصرف می کنید، اخیراً مصرف کرده اید یا ممکن است مصرف کنید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.
- داروهای زیر با این دارو تداخل دارند:
- سایمتیدین، آمانتادین، مگزولین، زیدودین، سیس پلاتین، کینین، پروکائینامید
- اگر قرص لوودوپا مصرف می کنید، با شروع درمان همزمان قرص پرامی پکسول پیوسته رهش توصیه می شود که دوز قرص لوودوپا کاهش یابد و تنظیم دوز لوودوپا توسط پزشک ضروری است.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

142 mm

pantone: Black

142 mm

Pramipexole extended-release tablet

Pramipexole (ER) tablets are presented as forms containing 0.75 and 1.5 mg; 10 tablets per blister pack, 3 blister with a leaflet in a box.

Category:

Dopamine agonist

Precautions and warnings:

- This medicine can cause drowsiness, so avoid driving or working with machines that require full alertness.
- Orthostatic hypotension may occur, during dose escalation, monitor closely Parkinson patients being treated with dopaminergic agonists.
- Do not take this medicine if you have allergy history.
- If you have any other disease or take any other medicine, inform your doctor.
- In case of the following cases, inform your doctor for adjusting the dose of the medicine if needed: Movement disorder and abnormal slowness of movements or repetitive movements such as tics, contraction or abnormal stretching of muscles, excessive sleepiness or falling asleep suddenly, excessive desire or addiction to harmful actions such as uncontrolled sexual behavior or gambling and betting, excessive euphoria or cognitive impairment, delusions or visual hallucinations
- Avoid sudden dose reduction or discontinuation of Pramipexole (ER) as it can cause a medical condition called neuroleptic malignant syndrome; As a result, reducing and stopping the dose of Pramipexole (ER) should be done under the supervision of a doctor.
- Caution while drinking Alcohol during treatment with Pramipexole (ER) is necessary.
- This medicine is not recommended for children or adolescents under 18 years.
- Do not chew, divide or crush this medicine.
- This medicine can be taken with or without food. Swallow the tablets whole with water.
- Avoid taking pramipexole tablets and pramipexole extended-release tablets at the same time.

Pregnancy and breast-feeding:

This medicine is not recommended during pregnancy or breast-feeding. If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your physician or pharmacist for advice before taking this medicine.

Dosage and administration:

- Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor if you are not sure how to take this medicine
 - If you forget to take a dose of this medicine, simply take the next single dose at the usual time. Do not take a double dose to make up for forgotten dose.
- Dosage of each drug is determined by doctor:
Parkinson, restless legs syndrome:
- Adults (over 18 years):
- The usual maintenance dose is 1.5 mg daily. However, higher dose may be prescribed by physician and also daily dose may increase up to maximum of 4.5 mg.

Adverse reactions:

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them and not all of these side effects can be seen in one person. In case of the following side effects, consult with your pharmacist or physician:

Serious side effects:

sleepiness; dizziness; nausea; fainting; sweating; hallucinations

the most common side effects in people taking pramipexole ER tablets for early Parkinson disease are: sleepiness; nausea and vomiting; constipation; dizziness; fainting; hallucinations; dry mouth; muscle spasms and edema

the most common side effects in people taking pramipexole ER tablets who have later stage Parkinson disease are:

abnormal movements; nausea; constipation; hallucinations; headache and anorexia

Drug interactions:

Inform your physician or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

The following drugs interact with Pramipexole (ER):

- Cimetidine; Amantadine; Mexiletine; Zidovudine; Cisplatin; Quinine; Procaainamide
- If you are taking Levodopa, the dose of Levodopa is recommended to be reduced when you start treatment with Pramipexole (ER) and it is necessary to adjust dosing of Levodopa by doctor.

Storage:

Store below 30° C, protect from light and moisture. Keep out of reach of children.

Manufactured by Pursina pharmaceutical Co.



105 mm