

- اگر شرایط بیماری شما بدتر شد، حتماً با پزشک مشورت نمایید.
- در حین مصرف این دارو حتی اگر علائم بیماری بهبود یافت، دوره درمان را کامل کنید.
- بدون مشورت با پزشک داروهای ضداسمی که همزمان با این دارو تجویز شده، قطع نکنید.
- مصرف این دارو برای درمان علائم آسم حاد (حمله آسم) توصیه نمی شود. در زمان حمله آسم باید از داروهایی که پزشک برای حمله تجویز کرده استفاده نمایید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف سایر دارو ها به خصوص داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید:
داروهای القاننده قوی آنزیم سیتوکروم P450 مانند ریفامپین؛ فنوبیتال؛ فنی توفین؛
جیم فیبروزیل.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:

بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۵ سال

درمان آسم و آلرژی های فصلی: ۱۰ میلی گرم یکبار در روز.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارضی که در صورت وقوع نیاز به توجه پزشکی دارند:

افزایش سطح آنزیم های کبدی، رفتار پرخاشگرانه، اضطراب و هرگونه تغییر غیرعادی در رفتار، واکنش حساسیت شدید، تیره شدن ادرار، ضعف و بی حالی غیرعادی، تپش قلب.

عوارضی که در صورت تداوم و یا شدت یافتن نیاز به توجه پزشکی دارند:

سردرد، درد شکمی، احساس ضعف و خستگی، سرفه، دندان درد، سرگیجه، سوء هاضمه (سوزش سر دل)، تب، گرفتگی بینی و راش های پوستی.

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



ساخت شرکت داروسازی پورسینا تهران - ایران

این دارو به صورت قرص های روکش دار حاوی ۱۰ میلی گرم ماده مؤثره مونتله لوکاست (به صورت سدیم) تولید و در بسته بندی های ۳۰ عددی به همراه یک بروشور ارائه می شود.

موارد مصرف دارو:

ضداسم، ضد حساسیت

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- دوران بارداری و شیردهی

- سالمندان و کودکان

- قبل از هرگونه عمل جراحی

- در صورت مصرف داروهای دیگر به خصوص القا کننده های آنزیم سیتوکروم P450

- در صورت ابتلا به بیماری های دیگر به خصوص اختلال عملکرد کبدی

- در صورت حساسیت به آسپرین

در هنگام مصرف دارو به موارد زیر توجه فرمایید:

• اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، بلافاصله پس از یادآوری آن را میل کنید، ولی اگر نزدیک زمان مصرف نوبت بعدی بود، از خوردن آن صرف نظر کرده و مقدار مصرف بعدی را طبق معمول میل نموده و آن را دو برابر نکنید.

موارد منع مصرف:

در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو یا داروهای مشابه، غذاها و رنگ ها با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری تنها زمانی مجاز است که نیاز به آن کاملاً محرز شده باشد و فواید حاصله به طور کامل، بر زیان احتمالی آن بر جنین برتری داشته باشد.

همچنین مصرف در دوران شیردهی تنها با تجویز پزشک متخصص مجاز است.

احتیاطات و هشدارها:

• مصرف دارو را بدون مشورت با پزشک قطع نکنید.

• پزشک خود را در جریان روند بهبودی قرار دهید.

142.0 mm

Sinkast Tablet Montelukast

How supplied:

Sinkast film-coated tablets are presented as forms containing 10 mg Montelukast (as sodium). 10 tablets per blister pack, 3 blisters with a leaflet in a box.

Category:

Antiasthmatic, Antiallergic agent.

Precautions:

Talk to your doctor or pharmacist before taking Sinkast tablet.

• If your asthma or breathing gets worse, tell your doctor immediately.

• Sinkast tablet is not meant to treat acute asthma attacks. If an attack occurs, follow the instructions your doctor has given you.

• It is important that you take all asthma medications prescribed by your doctor.

• Use medicine every day, even during symptoms-free periods.

• Do not discontinue Sinkast without discussing with your physician.

• Do not discontinue any concurrent antiasthmatic medication without physician's advice.

• Risk-benefit should be considered in hepatic function impairment and hypersensitivity to Aspirin.

Pregnancy and Breast-feeding:

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Risk-benefit should be considered before use of Sinkast tablet during pregnancy and breast-feeding.

Contraindications:

If you are allergic to Montelukast (Sinkast) or any other similar medications, ask your doctor before use.

Drug interactions:

Inform your doctor if you are taking any of the following medicines or any other medicines:

Potent cytochrome P450 enzyme inducers, such as Rifampin; Phenobarbital; Phenytoin; Gemfibrozil.

Dosage and administration:

Usual adult and adolescent (children 15 years of age and over) dose:

• Asthma, seasonal allergic: 10 mg once a day.

Side effects:

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Those indicating need for medical attention:

Elevated hepatic enzymes, aggressive behavior, agitation, anxiety and the other unusual behaviors, anaphylaxis, angioedema, cholestatic hepatitis, palpitations, pancreatitis, pruritus and urticaria.

- Those indicating need for medical attention only if they continue or are bothersome:

Headache, abdominal pain, asthenia or fatigue, cough, dental pain, dizziness, dyspepsia, fever, nasal congestion and skin rash.

Storage:

Store below 30 °C, protect from light and moisture.

Keep out of reach of children.