رسیلاست®۲۰

بیلاستین

بیلاستین به شکل قرص‌های خط دار حاوی ۲۰ میلی‌گرم بیلاستین ارائه می‌شود.
۱۰ قرص در هر بلیستر و ۳ بلیستر در یک جعبه بسته بندی می شود.

دسته دارویی: آنتی هیستامین (گیرنده H_1)

هشدارها و احتیاطات:

- در صورت سابقه حساسیت به بیلاستین یا سایر آنتی هیستامین‌ها (مانند واکنش‌های آنافیلاکتیک) باید مصرف بیلاستین قطع و به پزشک یا داروساز اطلاع داده شود.
- در صورت نارسایی کلیوی متوسط تا شدید ، پیش از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
- هنگام مصرف این دارو، از رانندگی و فعالیت‌های نیازمند هوشیاری کامل، خودداری نمایید.
- دارو باید دقیقاً طبق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
- بیلاستین نباید در بیماران با سابقه QT prolongation مانند افراد با سابقه آریتمی قلبی، هایپوکالمی؛ هایپومنیزیمی؛ برادی کاردی شدید؛ سابقه خانوادگی ایست ناگهانی قلبی؛ همزمان با سایر داروهای تشدیدکننده QT prolongation، استفاده شود.
- از مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال خودداری نمایید.

بارداری و شیردهی:

مصرف بیلاستین در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود. در صورت بارداری یا شیردهی یا اگر احتمال بارداری وجود دارد یا قصد بارداری دارید، پیش از مصرف این دارو با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.

مقدار و نحوه مصرف:

- دارو را یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا با آب میوه مصرف کنید.
- اگر دوز روزانه فراموش شد، به محض یادآوری مصرف شود و دوز بعدی در زمان معمول طبق دستور پزشک مصرف شود. برای جبران دوز فراموش شده نباید دوبرابر مصرف شود.
- در صورت اختلال در عملکرد کلیوی با پزشک مشورت شود.
- قرص را به طور کامل همراه با آب ببلعید.

مقدار مصرف هر دارو توسط پزشک تعیین می‌گردد اما دستور مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

اختلالات آلرژیک (التهاب ملتحمه بینی و کهیر):

- بزرگسالان و نوجوانان (۱۲ سال و بالای ۱۲ سال): ۲۰ میلی‌گرم بیلاستین یک بار در روز

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود؛ اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود؛ در صورت بروز عوارض زیر و یا هرگونه عارضه‌ی دیگر، با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- عوارض نیازمند مراقبت پزشکی: در صورت بروز واکنش‌های آلرژیک مانند مشکل در تنفس، سرگیجه، از دست دادن تعادل یا افت هوشیاری، تورم صورت، لب‌ها، زبان یا گلو و یا تورم و قرمزی پوست، درمان را متوقف و با پزشک تماس گرفته شود.
- عوارض رایج: سردرد، خواب آلودگی
- عوارض غیر رایج: نوار قلب غیر طبیعی، ضربان قلب نامنظم، تغییرات در عملکرد کبد و کلیه، اختلال در خواب، اضطراب، خستگی، سرگیجه، دل درد، افزایش اشتها، حالت تهوع، اسهال، التهاب معده، سو، هاضمه، تشنگی، احساس ضعف، تنگی نفس، خشکی دهان، خشکی بینی، خارش، تبخال در دهان، وزوز گوش، افزایش چربی خون

تداخلات دارویی:

- اگر داروی دیگری مصرف می‌کنید یا ممکن است مصرف کنید، پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید.
- داروهایی که ممکن است با بیلاستین تداخل داشته باشند:

سیکلوسپورین، اریترومایسین، کتوکونازول، ریتونایور، ریفامپیسین، دیلتیازم، لورازپام

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی پور سینا
تهران – ایران
PURSINA
پورسینا

Resbilast® 20
Bilastine

Bilastine scored tablets are presented as forms containing 20 mg Bilastine;
10 tablets per blister pack, 3 blisters in a box.

Category: Antihistamine (H_1-Receptor)

Precautions and warnings:

► If there is allergic history (such as anaphylactic reactions) to Bilastine or other antihistamines, stop taking Bilastine.
► Talk to doctor or pharmacist before using this tablet if there is moderate or severe renal impairment.
► Precaution is necessary before driving or operating machinery.
► Always use this medicine exactly as doctor or pharmacist has told.
► Bilastine should not be used in patients with a history of QTc prolongation like patients with history of cardiac arrhythmias; hypokalemia; hypomagnesemia; significant bradycardia; family history of sudden cardiac death; concomitant use of other QT/QTc-prolonging drugs.
► Do not give Bilastine to children under 12 years old.

Pregnancy and breast-feeding:

Bilastine is not recommended during pregnancy and breast-feeding. If you are pregnant or breast-feeding, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Dosage and administration:

► Take the tablet one hour before or two hours after taking food or fruit juice.
► If you forget to take the daily dose on time, give it on the same day as soon as you remember. Then, give the next dose at the usual time as prescribed by the doctor. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.
► If you are suffering from kidney disorders, consult the doctor.
Dosage of each drug is determined by doctor, but the usual dosage of Bilastine is as follows:
Allergic disorders (rhinoconjunctivitis and urticaria):
► Adults and adolescents (12 years and over 12 years of age): 20 mg Bilastine (1 scored tablet; once a day

Adverse reactions:

► Like all medicines, this medicine may cause unwanted side effects. In case of the following side effects, consult with the pharmacist or physician
► Those need for medical attention: Stop treatment and contact doctor if you have allergic reactions like difficulty in breathing, dizziness, collapsing or losing consciousness, swelling of your face, lips, tongue or throat, and/or swelling and redness of the skin.
► Common: Headache; somnolence
► Uncommon: Abnormal ECG heart tracing, irregular heartbeat; changes in liver or kidney function; dizziness, anxiety, tiredness, feeling of weakness, difficulty in sleeping; stomach pain, increased appetite, nausea, indigestion, diarrhea, gastritis, thirst; dyspnea; dry or uncomfortable nose, dry mouth; itching; oral herpes; tinnitus; increased blood fat

Drug interactions:

► Inform your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.
► Medicines which may interact with Bilastine:
Cyclosporine; Erythromycin; Ketoconazole; Ritonavir; Rifampicin; Diltiazem; Lorazepam

Storage:

Store below 30° C, protect from light and moisture.

Manufactured by
Pursina Pharmaceutical Co.
Tehran-Iran
PURSINA
پورسینا